


非洲马瘟

区域新威胁

非洲马瘟威胁马、驴、骡和斑马，首次入侵东南亚。2020年初传入泰国，极有可能影响你们国家。

非洲马瘟是一种病毒性传染病，对马的致死率可高达**95%**

该病由库蠓等小飞虫叮咬传播



何时疑似非洲马瘟?

- 发烧 (39-41°C / 102-106°F)
- 呼吸困难，痉挛性咳嗽，鼻孔扩张，流出泡沫状鼻液
- 眶上窝、眼睑、面部、颈部、胸部、肩部肿胀
- 眼结膜发红
- 马、驴、骡、斑马等马属动物病死



马，头部。眶上窝明显肿胀
[来源: OVI/ARC]



马，头部。眶上窝内脂肪组织非凹陷性水肿 [来源: FV/UCM]



马，结膜。严重水肿
[来源: OVI/ARC]



结膜肿胀（水肿）、发红
[来源: Camilla Weyer, SAEPS]



马。鼻腔大量白色泡沫
[来源: PIADC]


发现疑似非洲马瘟病例怎么办?

1. 联系官方兽医机构
2. 畜主应采取下列措施，防止疫情进一步扩散

洒喷驱蠓剂，
推荐浓度: 15% 避蚊胺



在黄昏至第二天黎明，
将马属动物圈在厩舍中




用1-4毫米孔径的网纱将马
属动物的厩舍门窗罩住，
同时在厩内喷洒驱蠓剂



禁止将马属动物
转运至其他村庄
或地区



避免发病动物应急



3. 在没有特定治疗措施的情况下，可对发病动物进行支持性治疗。

更多信息请访问:

OIE 亚太地区非洲马瘟专题：
<https://rr-asia.oie.int/en/projects/african-horse-sickness/>

Oie

WORLD ORGANISATION FOR ANIMAL HEALTH
Protecting animals, preserving our future



CHINA ANIMAL HEALTH AND EPIDEMIOLOGY CENTER
中文版翻译：中国动物卫生与流行病学中心