

ວິທີປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຕແປໝູ (Taeniasis)?

ພະຍາດໂຕແປໝູແມ່ນ ໜຶ່ງໃນພະຍາດເຂດຮ້ອນທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ເພີ່ມເຕີມ (Neglected Tropical Diseases)



1 ມີຢາປິ່ນປົວພະຍາດໂຕແປຕາມສະຖານບໍລິການສາທາລະນະສຸກ

2 ໄຂ່ຂອງແມ່ທ້ອງແປ ຈະປົນອອກມານໍາອາຈົມ. ຖ້າເຮົາຖ່າຍຊະຊາຍ ໄຂ່ຈະຖືກປົນເປື້ອນໃນສະພາບແວດລ້ອມຂ້າງນອກ (ລວມທັງໃນຜັກ ແລະ ນໍ້າ).

3a ລ້າງມືດ້ວຍສະບູ ແລະ ນໍ້າສະອາດ ທຸກຄັ້ງຫຼັງຈາກໃຊ້ອິດຖ່າຍ.

3b ລ້າງຜັກໃຫ້ສະອາດ ຫຼື ປຸງແຕ່ງໃຫ້ສຸກດີກ່ອນນໍາມາກິນ.

ໄຂ່ຂອງແມ່ທ້ອງແປ ຈະປົນອອກມານໍາອາຈົມ. ຖ້າເຮົາຖ່າຍຊະຊາຍ ໄຂ່ຈະຖືກປົນເປື້ອນໃນສະພາບແວດລ້ອມຂ້າງນອກ (ລວມທັງໃນຜັກ ແລະ ນໍ້າ).

- ສໍາລັບວິໄນຈອນການຕິດເຊື້ອແມ່ນ ໃຫ້ເບິ່ງລາຍຮັບຕາມໂຕເລກ
- ສໍາລັບສີຂຽວແມ່ນ ນາດຕະການກັນ ແລະ ຄວບຄຸມການຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຕແປໝູ

