



World Organisation
for Animal Health
Founded as OIE





ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ

หลักการ 3 ข้อในการป้องกันโรคปาก
และเท้าเปื่อย (FMD)

✓ แยกกัก

✓ ทำความสะอาด

✓ ข่าเชื้อโรค



✓ การแยกกัก




World Organisation
for Animal Health
Founded as OIE



การเข้าพื้นที่เสี่ยง:

จำกัดและจดบันทึกข้อมูลผู้ที่เข้ามา
ในสถานที่เลี้ยงสัตว์





World Organisation
for Animal Health
Founded as OIE



การฉีดวัคซีน:

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยปีละ 2 เข็ม:
เข็มแรกเมื่ออายุ 3-4 เดือน เข็มที่สอง
ใน 3-4 สัปดาห์ต่อมาหลังจากนั้น
ฉีดเป็นประจำทุก 6 เดือน





World Organisation
for Animal Health
Founded as OIE



การซื้อขาย:

ซื้อสัตว์จากแหล่งที่เชื่อถือได้เสมอ





World Organisation
for Animal Health
Founded as OIE



การกักสัตว์:

แยกกักสัตว์ที่นำเข้ามาใหม่เป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์
และสังเกตอาการที่อาจสงสัยว่าเป็นโรคระบาด





World Organisation
for Animal Health
Founded as OIE



โรงเรือนเลี้ยงสัตว์:

ทำความสะอาดโรงเรือนเลี้ยงสัตว์เป็นประจำ
และรักษาสุขอนามัยที่ดี



✓ การทำความสะอาด



World Organisation
for Animal Health
Founded as OIE



อุปกรณ์เลี้ยงสัตว์:

หมั่นทำความสะอาดรางอาหาร รางน้ำ
และอุปกรณ์อื่น ๆ



✓ การทำความสะอาด



World Organisation
for Animal Health
Founded as OIE



สุขอนามัยส่วนบุคคล:

ทำความสะอาดมือ ล้างรองเท้า เปลี่ยนเสื้อผ้า
และทำความสะอาดเครื่องมือทุกครั้งหลังสัมผัสสัตว์





World Organisation
for Animal Health
Founded as OIE



แยก:

แยกเสื้อผ้า รองเท้า และอุปกรณ์ที่สะอาด
ออกจากสิ่งของและบริเวณที่ปนเปื้อน





World Organisation
for Animal Health
Founded as OIE



การฆ่าเชื้อโรค:

ทำความสะอาดพื้นผิวก่อนแล้วจึงทำลายเชื้อโรคด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยเลือกใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสมตามคำแนะนำของสัตวแพทย์

