




World Organisation
for Animal Health
Founded as OIE



ຄວາມປອດໄພທາງຊີວະພາບ




ຫຼັກ 3 ປະການ ເພື່ອປ້ອງກັນ
ພະຍາດປາກເປື້ອຍລົງເລັບ (FMD)

✓ ການແຍກ

✓ ການທຳຄວາມສະອາດ

✓ ການຂ້າເຊື້ອ






World Organisation
for Animal Health
Founded as OIE



✓ ການແຍກ

ການຂ້າມ:

ຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມ ຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມ / ພະນັກງານຂອງຝາມ
ທີ່ຂ້າມໃນຄອກລ້ຽງສັດ.



NO
ENTRY



World Organisation
for Animal Health
Founded as OIE



✓ ການແຍກ

ການສັກຢາປ້ອງກັນ:

ສັກຢາປ້ອງກັນໃນເບື້ອງຕົ້ນ 2 ຄັ້ງ:

ສັກຄັ້ງທຳອິດ ເມື່ອສັດມີອາຍຸ 3-4 ເດືອນ ແລະ ຄັ້ງທີສອງ 3-4 ອາທິດຕໍ່ມາ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ ໃຫ້ສັກປ້ອງກັນທຸກໆ 6 ເດືອນ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.





World Organisation
for Animal Health
Founded as OIE



✓ ການແຍກ

ການຄ້າຂາຍສັດ:

ຊື້ສັດຈາກແຫຼ່ງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ສະເໝີ





World Organisation
for Animal Health
Founded as OIE



✓ ການແຍກ

ການກັກກັນ:

ແຍກສັດທີ່ຊື້ມາໃໝ່ໄວ້ຕ່າງຫາກ ຢ່າງນ້ອຍ 2 ອາທິດ
ແລະ ຕິດຕາມສັງເກດເບິ່ງ ອາການພາຍນອກຂອງມັນ.





World Organisation
for Animal Health
Founded as OIE



ການທຳຄວາມສະອາດ

ທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງສັດ:

ອະນາໄມຄອກສັດຢູ່ເລື້ອຍໆ ແລະ ຮັກສາສະພາບ
ສຸຂະອະນາໄມທີ່ດີ.





World Organisation
for Animal Health
Founded as OIE



ການທຳຄວາມສະອາດ

ເຄື່ອງມື ແລະ ຮາງນ້ຳ:

ໝັ້ນທຳຄວາມສະອາດ ຮາງອາຫານ, ຮາງນ້ຳ
ແລະ ອຸປະກອນອື່ນໆ





World Organisation
for Animal Health
Founded as OIE



ການທຳຄວາມສະອາດ

ສຸຂະອະນາໄມສ່ວນບຸກຄົນ:

ຫມັ້ນລ້າງມື ແລະ ທຳຄວາມສະອາດ ເກີບ, ເສື້ອຜ້າ
ແລະ ເຄື່ອງມືຕ່າງໆ ຫຼັງຈາກທີ່ສຳພັດສັດ.





World Organisation
for Animal Health
Founded as OIE



ການທຳຄວາມສະອາດ

ເຍກ:

ເກັບຮັກສາເສື້ອຜ້າ, ເກີບ ແລະ ອຸປະກອບຕ່າງໆ ທີ່ສະອາດ
ໂດຍເຍກອອກຈາກພື້ນທີ່ ແລະ ສິ່ງຂອງ ທີ່ປົນເປື້ອນ.





World Organisation
for Animal Health
Founded as OIE



✓ ການຂ້າເຊື້ອ

ການຂ້າເຊື້ອ:

ທຳຄວາມສະອາດກ່ອນສະເໝີ ແລ້ວຈຶ່ງຂ້າເຊື້ອໃນພາຍຫຼັງ.
ນຳໃຊ້ຢາຂ້າເຊື້ອທີ່ເໝາະສົມ ຕາມຄໍາແນະນຳຂອງສັດແພດ.

