



World Organisation
for Animal Health
Founded as OIE





生物安全

预防口蹄疫(FMD) 的3条关键原则

✓ 隔离

✓ 清洁

✓ 消毒





World Organisation
for Animal Health
Founded as OIE



隔离

访问权限:

控制和监控访客人员进入动物厩






World Organisation
for Animal Health
Founded as OIE



隔离

疫苗接种:

接种剂初级疫苗: 当犊牛3-4月龄时
接种第一剂, 在3-4周后接种第2剂,
随后每 6 个月定期接种疫苗。





World Organisation
for Animal Health
Founded as OIE



隔离

贸易:

始终从可靠卖方购买动物





World Organisation
for Animal Health
Founded as OIE



隔离

检疫:

将新买来的动物隔离至少2周，并观察它们的临床行为。





World Organisation
for Animal Health
Founded as OIE



清洁

动物厩:

经常把动物厩保持清洁及良好卫生。





World Organisation
for Animal Health
Founded as OIE



✓ 清洁

工具和饮水槽:

定期清洗喂食、饮水槽和其他工具。





World Organisation
for Animal Health
Founded as OIE



✓ 清洁

个人卫生:

处理完动物后，务必洗手、鞋子、衣服和工具。





World Organisation
for Animal Health
Founded as OIE



清洁

分开:

将干净的衣服、鞋子和设备与受污染的区域和物品分开。





World Organisation
for Animal Health
Founded as OIE



消毒

消毒:

先清洁，然后再消毒。按照兽医的建议使用适当的消毒剂。

