¿Cómo prevenir la teniasis y la cisticercosis?

Una infección parasitaria desatendida causada por Taenia solium







Tratar la infección por teniasis con medicamentos indicados por el personal de salud.




Lavarse las manos con agua y jabón después de ir al baño.



Lavar bien las verduras o cocinarlas antes de comerlas. 2

Los huevos de la tenia se liberan con las heces. Si se defeca al aire libre, se puede contaminar el ambiente (incluyendo los vegetales y el agua).





Mantener a los cerdos en corrales para evitar que se infecten.

3b

1

Teniasis. Las tenias viven en los intestinos de las personas infectadas.




Cisticercosis humana. La ingestión de huevos de la tenia (debido a una mala higiene después de ir al baño o al consumir alimentos o agua contaminados), resulta en quistes del parásito principalmente en el cerebro (causando convulsiones y epilepsia).

Cisticercosis porcina. Los cerdos que ingieren huevos de tenia (presentes en las heces o en el medio ambiente) desarrollan quistes del parásito, principalmente en los músculos (carne).



La carne infectada contiene quistes del parásito, que no siempre son fáciles de ver.



Vea las medidas de prevención y control en verde

Comer carne de cerdo

infectada cruda o poco

cocinada hará que las

personas desarrollen tenias.



Cocinar bien la carne de cerdo (no debe verse el color rosa) para matar el parásito.



La inspección de la carne puede identificar a los cerdos altamente infectados.



Reference number (FAO) CB6278ES
Reference number: OIE/PorkTape/ES/2021/12
Reference number: WHO/UCN/NTD/VVE/2021.